

NAVODILO ZA UPORABO

VENITAN Forte 10 mg/100 i.e. v 1 g gela

escin/natrijev heparinat

Za otekle in boleče noge

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 14-ih dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Venitan Forte in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Venitan Forte
3. Kako uporabljati zdravilo Venitan Forte
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Venitan Forte
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO VENITAN FORTE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Venitan Forte vsebuje dve zdravilni učinkovini:

- **escin**, ki je mešanica snovi, pridobljena iz semen navadnega divjega kostanja, ki deluje tako, da krepi napetost (tonus) ven ter zmanjšuje krhkost in prepustnost kapilar. Tako zmanjša otekanje, pospeši krvni obtok in izboljša presnovo v prizadetem tkivu.
- **heparin**, ki je normalna sestavina človeškega organizma. Deluje tako, da preprečuje strjevanje krvi, in s tem nastanek krvnih strdkov, ter deluje protivnetno.

Pomožni snovi dekspantenol in alantoin v zdravilu Venitan Forte pospešujeta prehajanje obeh zdravilnih učinkovin skozi kožo in zaradi svojih dodatnih lastnosti izboljšata njuno delovanje.

Zdravilo Venitan Forte priporočamo:

- **za lajšanje boleznih ven**, kot so:
 - boleče in vnete krčne žile (kažejo se kot oteklina ter občutek težkih in utrujenih nog (npr. zaradi dolgotrajnega stanja)),
 - krvni strdki v površinskih venah (tromboza),
 - vnetja ven s krvnimi strdki (tromboflebitisi), vnetja ven po injkcijah in infuzijah (flebitisi),
 - stanje po trombozi ali trombotičnem vnetju vene, ki povzroča zastoj odtekanja krvi z določenega področja in posledično otekanje, spremembe na koži, srbenje in bolečine (posttrombotični sindrom), krči v mečih, vnetja okolica golenske razjede;
- **za lokalno zdravljenje topih poškodb**, kot so podplutbe, udarnine, zmečkanine;
- **za preprečevanje nastanka in zdravljenje pooperativnih in drugih motečih brazgotin.**

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO VENITAN FORTE

Ne uporabljajte zdravila Venitan Forte

- če ste alergični (preobčutljivi) na escin, natrijev heparinat ali katero koli sestavino zdravila Venitan Forte,
- če imate poškodovano kožo, npr. pri opeklinah, ekcemu ali odprtih ranah.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Venitan Forte

Če imate vnetje kože, vnetje vene zaradi strdka ali podkožne zatrdline, močne bolečine, razjede, nenadno otekanje ene ali obeh nog, srčno ali ledvično popuščanje se morate nujno posvetovati z zdravnikom, ker imate lahko resno bolezen.

Uporaba gela Venitan Forte ne nadomesti dodatnih drugih zdravljenj in ukrepov, kot so uporaba hladnih obkladkov in nošenje predpisanih medicinskih kompresijskih nogavic.

Na voljo ni zadostnih študij o uporabi tega zdravila pri otrocih. Zdravila Venitan Forte zato ne smete uporabljati pri otrocih, mlajših od 12 let.

Zdravilo Venitan Forte ne sme priti v stik z očmi in sluznicami. Po uporabi gela Venitan Forte si temeljito umite roke.

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Medsebojno delovanje zdravila Venitan Forte z drugimi zdravili ni znano. Hkrati z zdravilom Venitan Forte ni priporočljivo na isti predel kože nanašati drugih zdravil za lokalno uporabo.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Ker ni zadostnih študij o uporabi tega zdravila med nosečnostjo in dojenjem, uporaba zdravila Venitan Forte med nosečnostjo in dojenjem ni dovoljena.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Venitan Forte nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Venitan Forte

Zdravilo Venitan Forte vsebuje natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), ki lahko povzroči alergijske reakcije (tudi zapoznele).

Zdravilo Venitan Forte vsebuje propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO VENITAN FORTE

Tanko plast zdravila Venitan Forte **1- do 3-krat na dan** nanesite na kožo obolelih predelov in okolico, ga narahlo vtrite in masirajte od spodaj navzgor. Gel nanašajte postopno, v manjših količinah.

Če imate **vnetje ven**, gela ne vtirajte, temveč le nanesite na kožo.

Če imate razjedo goleni, **pazite, da gela ne nanesete na razjedo**, temveč le na kožo v okolici razjede, kjer je motena prekrvitev.

Pri krčnih žilah priporočamo kot dodatno zdravljenje povijanje nog z elastičnim povojem ali uporabo kompresijskih nogavic.

Zdravila Venitan Forte ne smete uporabljati pri otrocih, mlajših od 12 let.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Venitan Forte neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):
preobčutljivostne reakcije z znaki kot so rdečina, srbenje, izpuščaji in pekoč občutek na koži.
V tem primeru gel takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA VENITAN FORTE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila Venitan Forte ne smete uporabljati po preteku datuma roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »EXP:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Venitan Forte

- Zdravilni učinkovini sta escin in natrijev heparinat.
1 g gela vsebuje 10 mg escina in 100 i. e. natrijevega heparinata.
- Pomožne snovi so: dekspantenol, alantoin, natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), natrijev hidroksid (E524), karbomer, simetikon (E900), propilenglikol (E1520), prečiščena voda.

Izgled zdravila Venitan Forte in vsebina pakiranja

Zdravilo Venitan forte je brezbarven, rahlo opalescenten, prozoren gel.

V škatli je tuba s 50 g ali 100 g gela.

Način izdaje zdravila Venitan Forte

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Izdelovalca

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Salutas Pharma GmbH, Lange Göhren 3, 39171 Osterweddingen, Nemčija

Navodilo je bilo odobreno

28. 6. 2012